

## CLISMA A DOPPIO CONTRASTO DEL COLON

Dieta: nei due giorni precedenti l'esame abolire l'assunzione di frutta e verdura

### IL GIORNO PRECEDENTE L'ESAME:

ORE 8 :

Effettuare la colazione con caffè, latte o thè, due fette di pane biscottato.

Assumere 1 flacone di X-Prep o 13 compresse di Pursennid (l'indicazione del nome del farmaco è puramente indicativa resta a discrezione del Medico curante la possibilità di prescrivere prodotti analoghi di comprovata pari efficacia)

ORE 12: pranzo con esclusione di frutta e verdura.

ORE 15: assumere una bustina da 30 gr. di Solfato di Magnesio disciolta in un bicchiere d'acqua. Nelle ore successive all'assunzione del Solfato di magnesio è necessario bere circa litri 1,5 di acqua non gasata entro le ore 21,00.

ORE 20: cena con una tazza di brodo vegetale.

ATTENZIONE: La preparazione descritta non ammette deroghe né in difetto (riduzione delle dosi), né in eccesso (aumento delle dosi). Sono inutili e controindicati i clisteri di pulizia.

Per i pazienti diabetici si tenga conto della presenza di glucosio nei preparati per la pulizia intestinale (da acquistare in farmacia) specifici per esami radiologici, mentre non esistono controindicazioni per le compresse di Pursennid .

RACCOMANDAZIONE : tutta la documentazione di eventuali esami precedenti deve essere portata in visione al momento dell'effettuazione dell'esame diagnostico.

AVVERTENZA: non sospendere la terapia medica eventualmente in atto.